

Kommentare unbedingte Aufmerksamkeit. Die ersten 4-5 Monate, bis die Reflexbewegunge
n des Babys als ni
cht
durch
unwillkürliche
Bewegungen
ausgeführt werden,
erscheinen die meisten der
Eltern
Anzeichen dafür, dass
die Saat für künftige
Probleme
kordinációs
werden
können
(z. B.
diejenigen
fejtartás
einseitig
asymmetrische
Glieder
benutzen
,
Muskeltonus
Unterschiede
usw.)
.
Die
ersten Anzeichen
sollte
wegen
der
Heilung
Vorteile einer frühen Behandlung
später
gefangen
werden
überwacht werden.
Diese
Erklärung ist
, dass
das Gehirn
ein
Mindestreserven

2 Monate altes Baby in einem Winkel hält seinen Kopf und zog Einhängesitz. Sehr anfällig zu weinen. Seie

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 04. März 2011 um 19:44 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 27. Februar 2015 um 08:32 Uhr

, die
physiologisch
verschwindet, wenn
nicht nutzt
hat

.
Die
Therapie
ist am
erfolgreichsten
, wenn
sie
auf die Reserve
zu mobilisieren
verwaltet

.
Die hasaltatásról einen Hals Schwäche, verminderte Ton Folge der zunehmenden Unfähigke
it des

Kopfes
Diese
schwere
Magen

-
sel
-
Verlegung
clean-up
kann nicht aufgelöst werden

.
In der Tat
!
Ungewöhnlich
aktiven
Muskeln
(z. B.
verminderte
Ton
)
kann
nicht
in
die normale Bewegung
durchgeführt werden.
So
zwang
Bewegungen und

2 Monate altes Baby in einem Winkel hält seinen Kopf und zog Einhängesitz. Sehr anfällig zu weinen. Seie

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 04. März 2011 um 19:44 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 27. Februar 2015 um 08:32 Uhr

Innervation

des

verstärkten

Fehler

,

so

eine weitere Erosion

des Babys

Heilungschancen

.

Dies sind die Muskeln, Sehnen und Bindegewebe Störungen des Hauses nicht überwunden werden kann.

Anna

Devin

Die Behandlung

Handbuch

von diesen Veränderungen

entwickelt

sind

voll

dauerhaft

korrigiert

so dass eine

normale, gesunde

Bewegung

.

Absolute daher vor, einen Spezialisten aufsuchen.