

Észrevétele feltétlen figyelmet érdemel. Az első 4-5 hónapban, amíg a reflexes mozgásokon kívül a csecsemőnek nem kell akaratlagos mozgást végeznie, legtöbbször a szülőknek tűnnek fel azok a jelek, amelyek a későbbi mozgásproblémák csírái lehetnek (pl. az említett féloldalas fejtartás, aszimmetrikus végtaghasználat, izomtónus eltérések stb.). A korai jelekre fel kell figyelni, mert a gyógyítás szempontjából a korai kezelés előnyei később behozhatatlanok. Ennek magyarázata, hogy van az agynak olyan tartalékállománya, amely élettanilag eltűnik, ha nincs igénybevéve. A terápia akkor a legsikeresebb, ha ezt a tartalékállományt sikerül mozgósítani.

A hasaltatásról: a nyakizmok gyengeségének, csökkent tónusának következménye a fej emelésének képtelensége. Ezt az okot szigorú hasonfeketéssel eltűntetni, megoldani nem lehet. Sőt! Kórosan működő izmokkal (pl.: csökkent tónusú) nem lehet normál mozgást végezni. Az így kikényszerített mozgások felerősítik és beidegzik a hibákat, tovább rontva ezzel a csecsemő gyógyulási esélyeit.

Ezek az izmokat, inakat és kötőszövetet érintő elváltozások önerőből nem leküzdhetők. A Dévény Anna által kidolgozott manuális kezeléssel ezek az elváltozások teljes mértékben végérvényesen korrigálhatók, lehetővé téve ezzel a normál, egészséges mozgáskivitelezést.

Feltétlen javaslom tehát, hogy forduljon szakemberhez.