

Observația dumneavoastră merită atenție deosebită. În primele 4-5 luni, pînă ce sugarul nu trebuie să efectueze mișcare voită, în afara mișcărilor reflexe, părinții sunt cei care observă acele semne care pot deveni mai tîrziu rădăcina problemelor (de ex.: ținerea înclinată a capului amintită, folosirea asimetrică a membrilor, tonus muscular diferit, etc.). Semnele precoc trebuie observate la timp deoarece din punctul de vedere al vindecării, avantajele tratamentelor începute cît mai devreme devin mai tîrziu irecuperabile. Aceasta se explică prin faptul că în creier există un material de rezervă care dacă nu este folosit, dispare fiziologic. Terapia are cel mai mare succes cînd se poate mobiliza acest material de rezervă.

Despre așezarea pe burtă: imposibilitatea ridicării capului este rezultatul musculaturii slabe la nivelul gîtului, al tonusului scăzut. Această cauză nu se poate înlătura prin așezarea severă pe burtă. Dimpotrivă, cu mușchi cu funcționalitate patologică (de ex.: cu tonus scăzut) nu se poate efectua mișcare normală. Astfel de mișcări forțate amplifică și impregnează greșelile, diminuînd în continuare șansele de vindecare ale sugarului. Aceste modificări, anomalii care ating mușchii, tendoanele și țesutul conjunctiv nu pot fi învinse din propria putere. Prin tratamentul manual elaborat de Dévény Anna aceste modificări se pot corecta definitiv, în întregime, deschizînd posibilitatea efectuării mișcării normale, sănătoase. Vă recomand, în orice caz să consultați un specialist.